

KEGLESNIT



Patienten har i dag her i klinikken fået foretaget el-konisation i lokalbedøvelse på indikationen dysplasi. Patienten er informeret om, at hun ved akutte komplikationer f.eks. blødning eller infektion udenfor klinikens åbningstid kan henvende sig til skadestuen. Patienten er i øvrigt informeret som følger:

Med et keglesnit fjernes det syge væv fra livmoderhalsen. Keglesnittet udføres i lokalbedøvelse med en lille elektrisk høl, det tager mindre end 10 min og det er smertefrit - når bortses fra smerten ved anlæggelse af lokalbedøvelse.

Bagefter er der normalt et ikke-ildelugtende mere eller mindre blodigt udflåd, dvs. pletblødninger, blodigt, gammelblodigt, brunt, sort eller grumset senere gult udflåd i 4-6 uger. Patienten bør kontakte klinikken ved afvigelser herfra. Patienten skal især være opmærksom på to ting, blødning og infektion.

Blødning forekommer hos mindre end 5 %. Blødning må ikke forveksles med ovennævnte pletblødninger og blodigt udflåd, som er normalt efter keglesnit. Det bløder, når der bliver ved med at komme friske blodklumper ud af skeden. Blødningen ser ofte voldsommere ud, end den er i virkeligheden.

Infektion forekommer hos mindre end 5 %. Infektion viser sig ved et ildelugtende udflåd. Infektion skyldes først og fremmest de bakterier, som allerede findes i skeden.

For at mindske risikoen for blødning og infektion, skal patienten undgå hård fysisk aktivitet (workout, jogging) og samleje i mindst 2 uger. Patienten kan passe sine daglige rutiner og må gerne cykle. Patienten bør også undlade tamponer i skeden, indtil udflåddet igen er normalt.

Det fjernede væv sendes til mikroskopi. Patienten får svar herpå om 2 uger telefonisk. Patienten skal komme til kontrol om 3-6 måneder, hvor der skal tages en almindelig celleprøve.

Keglesnit, som her beskrevet, har sjældent konsekvenser på længere sigt. Meget store keglesnit kan svække livmoderhalsen og øge risikoen for tidlig fødsel og ardannelse i livmoderhalskanalen, som kan medføre forsnævring af denne, hvilket kan give menstruationslignende smerter.

Med venlig hilsen
Jacob Philipsen

Hent vejledningen som PDF

Patientinformation om keglesnit på PDF.pdf

© Provided by MyClinic